

PAUTAS DE ALERTA / HIPOACUSIA

Estas son algunas de las conductas típicas de niños con disminución auditiva, en caso de observar alguna de las mismas en su hijo consulte con un profesional.

☞ De 0 a 3 meses (Vocalizaciones):

- ① Ante un sonido no se observan en el niño respuestas reflejas del tipo: parpadeo, agitación, despertar.
- ① No reacciona ante el sonido de una campanilla.
- ① Emite sonidos monocordes.
- ① No hay tranquilidad ante el consuelo materno.

☞ De 3 a 6 meses (Balbuceo rudimentario):

- ① Se mantiene indiferente ante los sonidos familiares.
- ① No se orienta hacia la voz de sus padres.
- ① No responde con emisiones a la voz humana.
- ① No emite sonidos para llamar la atención.

☞ De 6 a 9 meses (Balbuceo canónico):

- ① No emite sílabas (pa, ma, ta).
- ① No tiende a su nombre.
- ① No se orienta a sonidos familiares.
- ① No imita al adulto (va aproximándose al idioma materno.)
- ① Balbuceo menos rico.

☞ De 9 a 12 meses (Balbuceo mixto):

- ① No reconoce cuando le nombran a mamá y papá.
- ① No entiende una negación.
- ① No responde al “Dame” si no se le hace el gesto con la mano.

☞ De 12 a 18 meses:

- ① No señala objetos y personas familiares cuando se le nombran.
- ① No responde en forma distinta a sonidos diferentes.
- ① No nombra algunos objetos familiares.

☞ De 18 a 24 meses:

- ① No presta atención a los cuentos.
- ① No identifica las partes del cuerpo.
- ① No hace frases de dos palabras.

☞ A los 3 años:

- ① No se le entienden las palabras que dicen.
- ① No contesta a preguntas sencillas.

☞ A los 4 años:

- ① No sabe contar lo que le pasa.
- ① No es capaz de mantener una conversación sencilla.